

Kengetallen

E-27

Fokwaarde Uiergezondheid

▪ **Inleiding**

Klinische mastitis is een van de belangrijkste dierziekten bij melkvee. Er zijn management-strategieën ontwikkeld die kunnen helpen bij het reduceren van klinische mastitis op bedrijven. Genetische selectie is een andere strategie om het voorkomen van mastitis te verminderen. Alhoewel genetische selectie een langzaam proces is, resulteert het wel in een permanente verandering van de genetische weerstand van de veestapel tegen mastitisinfecties.

Klinische mastitis is de direct zichtbare vorm van mastitis. Daarnaast is er nog subklinische mastitis, die alleen tot uiting komt in een verhoging van het celgetal in de melk. Wanneer we tegen mastitis willen fokken dan betekent dit direct dat we de gezondheid van het uier willen verbeteren. Vandaar dat er een index voor uiergezondheid is ontwikkeld, de uiergezondheidsindex (afgekort *UGH*), waarmee zowel de incidentie van klinische mastitis als van subklinische mastitis kan worden teruggedrongen.

Erfelijke vooruitgang hangt van vier dingen af: betrouwbaarheid van fokwaarden, erfelijkheidsgraad, spreiding en selectie-intensiteit. Door zoveel mogelijk goede informatie te benutten worden de aanwezige genetische verschillen meer expliciet gemaakt, en worden ze zo betrouwbaar mogelijk geschat. Dit resulteert in stabielere schattingen van genetisch aanleg (fokwaarden). Voor verbetering van de aanleg in de veestapel is het aanwezig zijn van voldoende genetische variatie een belangrijke voorwaarde. Voor mastitis is het bestaan van genetische variatie aangetoond, wat betekent dat selectie mogelijk is.

Helaas bemoeilijkt de lage erfelijkheidsgraad van mastitis het om fokwaarden voor mastitis te schatten met een hoge betrouwbaarheid. Maar een mastitis infectie heeft grote invloed op het melkcelgetal. Of een koe een infectie heeft opgelopen kan dus afgelezen worden aan het verloop van het celgetal in de melk gedurende de lactatie. Het grote voordeel hiervan is dat melkcelgetal routinematig in de melkcontrole wordt bepaald, zodat er een constante stroom betrouwbare data beschikbaar is om fokwaarden mee te schatten.

Bij de huidige fokwaardeschatting voor *UGH*, wordt gebruik gemaakt van zowel celgetalgegevens als van klinische mastitisgegevens. De klinische mastitisgegevens worden sinds 2016 in de fokwaardeschatting gebruikt en zijn gebaseerd op registraties van melkveehouders. Subklinische mastitis wordt afgeleid uit de celgetal gegevens. Daarnaast worden aan de hand van celgetalgegevens een aantal verschillende celgetal kenmerken gedefinieerd. Deze extra kenmerken hebben een dermate hoge correlatie met klinische en subklinische mastitis dat er betrouwbare fokwaarden voor klinische en subklinische mastitis geschat kunnen worden.

Met behulp van de gebruikte methodiek is het mogelijk om voor stieren met een dochtergroep uit de proefperiode een uiergezondheidsindex te berekenen met een betrouwbaarheid tussen de 80 en 85%. Dat betekent dat de fokwaarden van stieren een spreiding laten zien die ongeveer gelijk is aan 90% van de totale genetische spreiding.

Dit document geeft een beschrijving van de gebruikte gegevens, kenmerken en model om te komen tot een index voor uiergezondheid.

▪ Definitie van uiergezondheid

Wat is een gezonde uier? Op die vraag zijn vele antwoorden mogelijk, die reiken van het exterieur van de uier tot de mate waarin een uier infectievrij is.

Uierinfecties zijn een grote kostenpost voor melkveehouders. Daarom is voor de fokwaarden Uiergezondheid gekozen om te concentreren op het voorkómen van infecties. Dat wil zeggen, de fokwaarden moeten helpen een koe te fokken die minder gevoelig is voor mastitis infecties.

Mastitis wordt veroorzaakt door een aantal verschillende bacteriesoorten. *Staphylococcus aureus* is misschien wel het beruchtst, vanwege de hardnekkige infecties en de grote schade die het veroorzaakt. Men kan ervoor kiezen om zich bij het fokken te concentreren op een enkele veroorzaker, zoals *Staphylococcus aureus*. Maar zo ontstaat er een wildgroei aan fokwaarden. Daarnaast gaat het ons om de koe en niet om de bacterie: we willen een koe fokken die over de hele linie weerbaarder is tegen uierinfecties.

Een gezonde uier is dus een uier die niet gevoelig is voor klinische, dan wel subklinische mastitis, onafhankelijk van de veroorzaker van de infectie.

▪ Kenmerken en Fokdoel

In publicaties worden fokwaarden voor twee mastitiskenmerken en de index gebruikt: de fokwaarden voor subklinische mastitis, klinische mastitis en een uiergezondheidsindex. In de uiergezondheidsindex zijn klinische en subklinische mastitis ingewogen naar de economische schade die ze veroorzaken. In totaal zijn er zeven kenmerken gedefinieerd die gebruikt worden in de fokwaardeschatting. Naast de twee gepubliceerde fokwaarden, zijn er vijf kenmerken die worden gebruikt om resistentie tegen mastitisinfecties te voorspellen: de zogenaamde indicatorkenmerken.

▪ Indicatorkenmerken

Uit onderzoek is gebleken dat celgetallen uit proefmelkingen patronen laten zien, waaruit eventuele besmettingen en infecties afgeleid kunnen worden. Die patronen en andere afgeleide kenmerken laten derhalve een correlatie zien met mastitisinfecties (klinisch of subklinisch), en geven dus informatie over de gevoeligheid voor infecties van een dier, nog voor dat dit dier een infectie krijgt.

De vijf indicatorkenmerken zijn:

1. *SCS150*: de ²log van het gemiddelde celgetal tussen dag 5 en 150 van de lactatie;
2. *SCS400*: de ²log van het gemiddelde celgetal tussen dag 151 en dag 400 van de lactatie;
3. *Infectie*: een indicatie (0/1) of er minimaal één celgetal boven de 150.000 cellen/ml is geregistreerd tijdens een lactatie tussen dag 5 en 400 van de lactatie; dit kenmerk registreert of er sprake is geweest van een infectie.
4. *Ernst*: de fractie van het totaal aantal testdagen tot dag 400 van de lactatie, waarop het celgetal boven de 150.000 cellen/ml lag (0, ..., 1); dit kenmerk registreert hoe ernstig de infectie is geweest.
5. *Piek*: het aantal identificeerbare pieken in het celgetal gedurende een lactatie tot dag 400, zonder te specificeren welk piekpatroon dat dan is. Een piek is gebaseerd op drie opeenvolgende celgetalbepalingen, waarbij waarden tot 200.000 cellen/ml als 'laag' gekenmerkt worden en waarden boven de 500.000 cellen/ml als 'hoog'. Er zijn twee soorten pieken gedefinieerd: laag-hoog-laag en laag-hoog-hoog (aangeduid als -+- en -++).

Tabel 1. Voorbeeld testdaglijst voor een koe in tweede lactatie. Zie de tekst voor uitleg over de afleiding van de waarnemingen uit de celgetal data.

testdag	Dagen aan de melk	celgetal (x 1.000 cellen/ml)	Infectie Ernst (> 150.000 cellen/ml)	Piek
1	5	32		-
2	19	44		-
3	33	54		-
4	47	49		-
5	61	69		-
6	75	87		-
7	89	67		-
8	103	54		-
9	117	62		-
10	131	49		-
11	145	38		-
12	159	45		-
13	173	120		-
14	187	630	ja	+
15	201	558	ja	+
16	215	361	ja	0
17	229	213	ja	0
18	243	177	ja	-
19	257	150		-
20	271	185	ja	-
21	285	174	ja	-
22	299	162	ja	-
23	313	237	ja	0
24	327	111		-
25	341	114		-

In Tabel 1 staat een voorbeeld uitgewerkt voor een tweedekalfs koe. In de tabel worden de celgetallen weergegeven voor opeenvolgende testdagen (tweewekelijkse melkcontrole).

Het gemiddelde celgetal voor het eerste deel van de lactatie (alle testdagen tussen dag 5 en dag 150 van de lactatie) was 55.000 cellen/ml (zie Tabel 1). Voor het tweede deel van de lactatie, dag 151 tot en met uiterlijk dag 400 van de lactatie, was het gemiddelde celgetal 231.000 cellen/ml. Voor de kenmerken *SCS150* en *SCS400* heeft deze koe in deze lactatie dus een score van respectievelijk:

$$\begin{aligned} \text{SCS150: } & {}^2\log (55.000) = 15,7 \\ \text{SCS400: } & {}^2\log (231.000) = 17,8 \end{aligned}$$

Zowel kenmerk *Infectie* en *Ernst* worden afgeleid uit het aanwezig zijn van testdagen met een verhoogd celgetal (celgetal > 150.000 cellen/ml). In de tabel staan die dagen aangegeven met een 'ja'. *Infectie* is een 'alles of niets' kenmerk, dat aangeeft of er dagen in de lactatie waren met een celgetal groter dan 150.000 cellen/ml.

In ons voorbeeld krijgt de koe voor *Infectie* een 1 (er waren dagen met een celgetal > 150.000 cellen/ml). *Ernst* neemt het aantal testdagen dat het celgetal hoger dan 150.000 cellen/ml was en deelt dat door het totaal aantal testdagen. Voor *Ernst* krijgt de koe $9/25 = 36\%$.

Piek telt het aantal identificeerbare pieken in het celgetal. Voor *Piek* moet er een duidelijk zichtbaar patroon van celgetallen zichtbaar zijn op drie opeenvolgende testdagen, te weten laag-hoog-hoog (- + +) of laag-hoog-laag (- + -). Daarbij staat hoog (+) voor een celgetal hoger dan 500.000 cellen/ml en laag (-) voor een celgetal van minder dan 200.000 cellen/ml. Testdagen waarin het celgetal tussen die twee grenswaarden in liggen worden met een (0) aangemerkt. In de tabel zien we één (- + +) patroon rondom dag 187 van de lactatie. Voor deze lactatie krijgt de koe dus *Piek* = 1 toegekend. Maar het is mogelijk dat een koe meerder pieken in een lactatie laat zien.

In Tabel 2 staan de erfelijkheidsgraden en de genetische spreidingen voor deze indicatorkenmerken vermeld.

Tabel 2 Erfelijkheidsgraden (h^2) en genetische spreiding (σ_g) voor de kenmerken die als basis dienen voor de uiergezondheids-index.

	Pariteit 1		Pariteit 2		Pariteit 3	
	h^2	σ_g	h^2	σ_g	h^2	σ_g
<i>SCS150</i>	0,088	40,706	0,098	48,135	0,087	48,301
<i>SCS400</i>	0,105	40,509	0,101	39,090	0,111	41,677
<i>Infectie</i>	0,061	0,120	0,060	0,115	0,066	0,113
<i>Ernst</i>	0,094	8,602	0,094	9,434	0,096	10,198
<i>Piek</i>	0,050	0,102	0,055	0,124	0,061	0,136
<i>SCM</i>	0,022	0,066	0,026	0,071	0,041	0,094
<i>CM</i>	0,025	0,039	0,024	0,042	0,032	0,050

▪ Mastitis kenmerken

Subklinische mastitis

Voor subklinische mastitis (*SCM*) is de UGCN-definitie (UGCEN-project “Beest 5”: Verbeteren van weerstand tegen mastitis via fokkerij, 2007) aangehouden van laag-laag-hoog ('- - +') voor het celgetal op drie opeenvolgende testdagen. Voor vaarzen geldt een grenswaarde van 150.000 cellen/ml, voor koeien is een celgetal van 250.000 cellen/ml de drempel. Subklinische mastitis wordt als een 0/1-kenmerk geanalyseerd: Als een koe of vaars tijdens de lactatie het '- - +' patroon laat zien op drie opeenvolgende celgetalmetingen dan is de waarneming *SCM* = 1, in alle ander gevallen is het *SCM* = 0. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen koeien met maar één infectie en koeien met meerdere infecties gedurende de lactatie. Dat is omdat we tegen het voorkomen van subklinische mastitis willen selecteren, en niet zozeer voor koeien met meer of minder gevallen van subklinische mastitis.

In principe wordt *SCM* berekend over dezelfde periode als de indicatorkenmerken hierboven, van dag 5 t/m dag 400 van de lactatie. In het begin van de lactatie ligt het patroon echter over lactaties heen: als een koe op haar eerste testdag van de lactatie een celgetal laat zien boven de grenswaarde, dan worden de laatste twee testdagen van de vorige lactatie gebruikt om vast te stellen of het celgetalpatroon voor subklinische mastitis '- - +' zich voordoet. Op de tweede testdag van de lactatie wordt voor de beoordeling de laatste testdag van de vorige lactatie meegenomen. Dit geldt ook als de laatste testdagen van de vorige lactatie later dan op dag 400 van de vorige lactatie plaats vindt. Zodoende zijn de patronen '- - droog +' en '- droog - +' equivalent aan '- - +'

Voor vaarzen worden op de eerste en tweede testdag van de lactatie de voorgaande dagen uiteraard op onbekend gezet ('0'). Maar voor de patroon herkenning wordt bij vaarzen op de eerste en de tweede testdag van de lactatie aangenomen dat '0' hetzelfde is als '-', zodat de patronen '0 0

+’ (op de allereerste testdag) en ‘ 0 - +’ (op de tweede testdag) ook gelden als een subklinische besmetting.

Klinische mastitis

Sinds april 2016 worden klinische(zichtbare) mastitis registraties van melkveehouders gebruikt in de fokwaardeschatting. Daarnaast heeft onderzoek voor het UGCN-project Beest 5 aangegeven dat de genetische aanleg voor weerstand tegen klinische mastitis infecties goed is te voorspellen uit de indicator kenmerken en de aanleg voor resistentie tegen subklinische mastitis (zie Tabel 8 voor de genetische correlaties tussen de kenmerken).

Index Uiergezondheid

Uit de fokwaarden *CM* en *SCM* wordt een index samengesteld waarin de economische schade van een klinisch geval van mastitis en een subklinisch geval van mastitis zijn verwerkt. Naast de fokwaarden *CM* en *SCM* wordt deze index gepubliceerd om een totaalbeeld van uiergezondheid te geven. Voor details over de samenstelling van de index zie onder (‘Uiergezondheid-index’).

▪ **Gegevens**

Observaties

Gegevens over klinische mastitis zijn niet beschikbaar. Voor de fokwaardeschatting wordt gebruik gemaakt van het celgetal gemeten op de proefmelkdag. De data wordt op testdagniveau aangeleverd, maar op lactatieniveau geanalyseerd. Dat wil zeggen dat de kenmerken gelden voor de hele lactatie, maar worden afgeleid uit de data van alle beschikbare testdagen in die lactatie.

De dagproducties moeten aan de volgende eisen voldoen:

- Een koe moet stamboek geregistreerd zijn (*S*) en de vader van de koe moet bekend zijn;
- Alleen officiële (gefiatteerde) dagproducties worden meegenomen, dit kunnen ook dagproducties zijn die door veehouders in eigen beheer zijn verzameld;
- Alleen de dagproducties van lactatie 1 t/m 3 van een koe worden meegenomen;
- Alleen dagproducties vanaf dag 5 tot en met einde lactatie worden meegenomen;
- Een koe moet een bekende verblijfplaats hebben op de testdag;
- De leeftijd bij afkalven moet minimaal 610 dagen zijn;
- Er moet minimaal 1 geldige testdag met celgetalmeting bekend zijn.
- Voor de patroonkenmerken (*Piek* en *SCM*) geldt een aanvullende eis dat binnen een lactatie tussen opeenvolgende proefmelkingen met een celgetalmeting niet meer dan 84 dagen mogen zitten. Is dit wel het geval dan wordt het record voor deze lactatie op ‘missend’ gezet voor de kenmerken *Piek* en *SCM*.

Afstamming

Familierelaties tussen dieren worden meegenomen bij de berekening van de fokwaarden. Aan elkaar gerelateerde dieren delen een zekere hoeveelheid DNA, zodoende vormt de familie van een dier een extra informatiebron over de genetische aanleg van dit dier. Dit betreft als eerste ouders en nakomelingen van een dier. Maar ook (half-) broers en zussen, verre voorouders (via ouders en grootouders) en kleinkinderen (via directe nakomelingen). Een dergelijk netwerk van relaties beslaat meerdere generaties en is een waardevolle aanvulling op informatie van ouders en uit de eigen waarnemingen.

Iedere afstamming eindigt uiteindelijk met ouders die onbekend zijn. Deze onbekende ouders worden gegroepeerd (*phantom groep*), waarbij de gemiddelde genetische aanleg van deze groep als voorspeller wordt gebruikt voor de nakomelingen.

Doordat bij fokkerij niet alleen dieren worden geselecteerd binnen het eigen ras maar ook gebruik wordt gemaakt van dieren van andere rassen zijn er veel genetische (familie)relaties ontstaan tussen rassen. Te denken valt aan het gebruik van Holstein Friesians in het Fries Hollandse ras en

in de MRIJ-populatie. De vele genetische relaties tussen rassen maken het mogelijk om voor de verschillende rassen gelijktijdig fokwaarden te berekenen.

Phantom groepen

Wanneer een ouder niet bekend is, wordt deze ouder vervangen door een schijnouder of "phantom parent". Phantom parents kunnen worden samengevoegd tot phantom groepen of genetische groepen. Een phantom groep geeft een soort vervangende genetische waarde van een onbekende ouder. De genetische waarde van een phantom groep wordt bepaald door alle dieren die hieraan verbonden worden. Het is van belang om dieren in een groep bij elkaar te brengen die hoogstwaarschijnlijk hetzelfde genetisch potentieel hebben. De factoren die in de fokwaardeschatting een verschil in genetisch potentieel kunnen veroorzaken, en daardoor voor het definiëren van phantomgroepen van belang zijn, zijn:

1. Ras

Voor ieder ras wordt een aparte groep gevormd. In de praktijk betekent dit ca. 30 verschillende rasgroepen. In geval van een kruisingdier, wordt het dier ingedeeld bij het ras met het hoogste bloedaandeel. Indien de bloedaandelen gelijk zijn, zijn er twee situaties:

- voor 50%/50% FH/HF-kruisingen en 50%/50% MRIJ/HF-kruisingen zijn twee aparte "ras"-groepen; ze worden niet aan één van de ouderrassen gekoppeld;
- voor de overige 50%/50%-kruisingen geldt dat het dier wordt ingedeeld bij één van de ouderrassen op basis van de fokrichting van de kruising. Hierbij worden drie richtingen onderscheiden: melk, dubbeldoel en vlees. De fokrichting bepaalt welk van de ouderrassen leidend wordt. Het ras behorend tot de fokrichting vlees is leidend, vervolgens het ras behorend tot de dubbeldoel fokrichting en tenslotte het ras behorend tot de fokrichting melk. In het geval dat beide rassen een gelijke fokrichting hebben, wordt het eerste ras in de rasbalk leidend.

2. Geboortejaar

Ieder geboortejaar vormt een groep. Runderen die voor 1950 zijn geboren, worden aan het geboortejaar 1950 gekoppeld.

Het minimum aantal dieren (ouders) per phantomgroep is 100. Indien het aantal van 100 niet wordt bereikt, worden phantomgroepen samengevoegd. Er wordt samengevoegd per geboortejaar tot het aantal van 100 is bereikt of tot maximaal 10 geboortejaren zijn samengevoegd. Als een ras zó klein is dat het minder dan 20 dieren bevat wordt de phantomgroep toegevoegd aan de restgroep. Deze restgroep wordt gevormd door allerlei phantomgroepen die te weinig dieren hebben om zelf een betrouwbare schatting te kunnen realiseren.

De invloed van de phantomgroep-schatting op de koe- of stierindex neemt af naarmate de phantomgroep meer generaties verwijderd is van het betreffende dier, en/of naarmate het rund zelf meer informatie krijgt door nakomelingen en/of eigen lactatie(s).

▪ Statistisch model

De fokwaarden voor de mastitis resistentie kenmerken worden geschat met een diemodel, volgens de BLUP-techniek (Best Linear Unbiased Prediction). Een dier kan een hogere aanleg voor het oplopen van een infectie hebben zonder daadwerkelijk een infectie op te lopen, daarom wordt de informatie over subklinische en klinische infecties aangevuld met informatie uit de fokwaarden voor de onderliggende kenmerken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van correlaties tussen alle kenmerken (zie Tabel 6). De fokwaardeschatting is hiermee een 'multiple trait' fokwaardeschatting. Alle kenmerken worden geanalyseerd met hetzelfde statistische model:

$$Y_{ijklmnopqr} = BJ_j + JM_k + lftd_l + n_td_m + ARD_n + het_o + rec_p + int_q + dier_r + rest_{ijklmnopqr}$$

De effecten in het model

De effecten in het model zijn:

Y_i	= observatie voor kenmerk i (CM, SCM of indicatorkenmerk)
BJ_j	= bedrijf*jaar-klasse van observatie
JM_k	= jaar*maand klasse van observatie
$lftd_i$	= leeftijd bij afkalven (10 daagse klassen)
n_td_m	= aantal geregistreerde testdagen in de lactatie
ARD_n	= aantal risicodagen in de lactatie (aantal dagen tussen 1 ^{ste} en laatste testdag)
het_o	= heterosis effect
reC_p	= recombinatie effect
int_q	= inteeltcoëfficiënt
$dier_r$	= additief genetisch effect (fokwaarde) van het dier
$rest_{ijklmnopqr}$	= restterm van Y_i , dat deel wat met het model niet kan worden verklaard.

Bedrijf*jaar klasse

Het niveau van de observaties verschilt per bedrijf. Binnen een bedrijf kan de situatie met betrekking tot de kenmerken ook veranderen. Het bedrijfseffect wordt daarom voor ieder jaar opnieuw geschat in de bedrijf*jaar klasse. Een jaar loopt van 1 januari tot 31 december. De toekenning van een waarneming aan een bedrijf is afhankelijk van het soort kenmerk (zie Tabel 3). In het grootste deel van de gevallen is dit hetzelfde bedrijf voor alle kenmerken, maar de juiste toekenning van een waarneming aan een bedrijf is een punt van aandacht bij dieren die tijdens de lactatie verhuizen.

Tabel 3. Toekenning van kenmerken aan bedrijven, wanneer een koe tijdens een lactatie verhuist.

Kenmerk	Toekenning (bedrijf) ^{*)}	Datum	Periode (dagen lactatie)
SCS150	Bedrijf waar het langste deel van de periode is doorgebracht.	Eerste testdag van periode	5 – 150
SCS400	Bedrijf waar het langste deel van de periode is doorgebracht.	Eerste testdag van periode	151 – 400
Infectie	Bedrijf waar de piek (eerste verhoging) is geconstateerd.	Eerste testdag van SCC verhoging	5 – 400
Ernst	Bedrijf waar de piek (eerste verhoging) is geconstateerd.	Eerste testdag van SCC verhoging	5 – 400
Piek	Bedrijf waar de piek (eerste verhoging) is geconstateerd.	Eerste testdag van SCC verhoging	5 – 400
SCM	Bedrijf waar de infectie is geconstateerd.	Eerste testdag van SCC verhoging	5 – 400
CM	Bedrijf waar de infectie is geconstateerd.	Datum registratie infectie	-15 – 400


^{*)} Als de observatie negatief is (geldig record maar geen waarneming), dan wordt de observatie toegekend aan het bedrijf waar het langste deel van de periode is doorgebracht.

Jaar*maand klasse

De infectiedruk verschilt per seizoen en van jaar tot jaar (Figuur 1). Om hier rekening mee te houden wordt aan iedere lactatie een klasse toegekend op basis van het jaar en de maand van

afkalven (de start van de lactatie in kwestie). Om verstremeling met bedrijf*jaar te voorkomen, begint ieder maand-klasse op de 15^{de} van de maand in kwestie.

Figuur 1. Jaar*maand effecten van januari 2010 tot en met december 2021 voor subklinische mastitis in de eerste lactatie (SCM 1), tweede lactatie (SCM 2) en derde lactatie (SCM 3).



Leeftijd bij afkalven

Het is gebleken dat er een zekere afhankelijkheid van de mastitiskenmerken is met de leeftijd waarop een dier afkalft. Dieren worden ingedeeld in leeftijdsklassen die onderling 10 dagen verschillen, waarbij de klassen gaan van 610 tot 2040 dagen in leeftijd.

Aantal geregistreerde testdagen en Aantal risicodagen

De kans om een infectie waar te nemen aan het verloop van het celgetal neemt af met een toenemend interval tussen testdagen. Andersom is de kans om een infectie te missen bij een zeswekelijkse melkcontrole groter dan bij een driewekelijkse melkcontrole.

Daar staat tegenover dat, onafhankelijk van de aanleg van een koe, de kans op minstens één infectie gedurende de lactatie toeneemt met de lengte van de lactatie. Anders gezegd: de kans op een infectie tussen dag 5 en dag 120 van de lactatie is kleiner dan de kans op een infectie tussen dag 5 en dag 305.

Beide effecten zijn een resultaat van verstreken tijd (tussen testdagen en gedurende de lactatie) en zeggen niks over de genetische aanleg van een koe. Vandaar dat in het model de twee effecten opgenomen zijn: 1) het aantal proefmelkingen in de lactatie en 2) het aantal risicodagen tussen eerste en laatste proefmelking.

Het aantal proefmelkingen zegt iets over de lengte van de lactatie tot dan toe of het interval tussen proefmelkingen. Welke van de twee het is, is van minder belang, omdat beide hetzelfde effect hebben: Een hoger aantal proefmelkingen verhoogt ook de kans dat er iets gevonden wordt. Voor de telling van het aantal proefmelkingen worden alleen proefmelkingen meegenomen met een geldige celgetalwaarneming.

Correctie voor het aantal risicodagen moet ervoor zorgen dat het laatste beetje verschil tussen de verschillende proefmelkingschema's weggevangen wordt.

Heterosis- en recombinatie-effect

Heterosis- en recombinatie-effecten spelen een rol bij het kruisen van rassen. Dit zijn genetische effecten die niet worden doorgegeven aan de nakomeling. Uit onderzoek is gebleken dat voor deze effecten gecorrigeerd dient te worden. De grootte van de heterosis wordt gedefinieerd als het verschil in niveau van het kenmerk in de kruising met het gemiddelde van de ouderassen. Recombinatie is het verlies van het meestal positieve effect van heterosis en treedt op wanneer

het eerder verkregen kruislingproduct wordt teruggekruist met één van de ouderrassen. Dit is wordt ook beschreven in E-hoofdstuk 7.

Inteeltcoëfficiënt

De mate van inteelt kan effect hebben op het voorkomen van een uierinfectie. Hoe hoger de inteeltcoëfficiënt hoe groter het negatieve effect, dit noemen we inteeltdepressie. Door inteelt in het model op te nemen wordt rekening gehouden met de gevolgen van inteelt op het voorkomen van uier infecties.

Dier

Dit is het additief genetische effect of fokwaarde, het effect waar het uiteindelijk om gaat. De variabele *dier* bevat de (genetische) bijdrage van een dier aan de observatie en bepaalt de fokwaarde van een dier. Daarnaast wordt bij het bepalen van de fokwaarde ook alle informatie van voorouders en nakomelingen gebruikt.

▪ **Uiergezondheidsindex**

De voor publicatie bedoelde fokwaarden zijn respectievelijk: *SCM*, *CM* en *UGH*, waarbij *UGH* de uiergezondheidsindex is bestaande uit *SCM* en *CM*. Hoewel fokwaarden voor alle kenmerken (dus ook de indicatorkenmerken) apart geschat worden voor de eerste drie lactaties, wordt per kenmerk maar één fokwaarde weergegeven voor het overall kenmerk. De fokwaarde voor het overall kenmerk is een index waarin de lactatie-fokwaarden gewichten per pariteit toegekend krijgen zoals vastgesteld in het Testdag Model voor productiekenmerken:

$$FW_i = 0,41 FW_{i1} + 0,33 FW_{i2} + 0,26 FW_{i3}$$

In Tabel 4 staan de erfelijkheidsgraden en spreidingen vermeld van de overall kenmerken.

Tabel 4 Erfelijkheidsgraden (h^2) en spreidingen (σ_g) van de (absolute) fokwaarden voor de overall kenmerken. De drie lactatie fokwaarden voor ieder kenmerk zijn ingewogen in een enkele index voor dat kenmerk. Erfelijkheidsgraad en spreiding van de uiergezondheidsindex zijn ook gegeven.

Kenmerk	h^2	σ_g
<i>SCS150</i>	0,165	43,255
<i>SCS400</i>	0,173	38,794
<i>Infectie</i>	0,120	0,110
<i>Ernst</i>	0,158	8,864
<i>Piek</i>	0,121	0,113
<i>SCM</i>	0,056	0,068
<i>CM</i>	0,062	0,039
<i>UGH</i>	0,089	0,051

Daarnaast is er een uiergezondheidsindex waarin de economische schade van klinische en subklinische mastitis zijn verwerkt. De gemiddelde schade van een geval van klinische mastitis wordt geschat op € 196,- (Huijps et al., 2008). Daarin zijn verwerkt de kosten van productieverlies, veterinaire kosten, extra arbeid en afvoer van zwaar geïnfecteerde dieren (15% van geïnfecteerde dieren). Voor subklinische mastitis geldt een gemiddelde schade van € 83,- per geval (Halasa et al., 2008). Deze schade is gebaseerd op een gemiddeld productieverlies per geval.

Op de absolute schaal worden zowel *CM* als *SCM* uitgedrukt in het interval [0,1]. M.a.w. een fokwaarde van +0.01 komt overeen met gemiddeld een 1% hogere incidentie van mastitis in de groep nakomelingen. Op absolute schaal zou de index er als volgt uit komen te zien:

$$I_{abs} = (-83) * FW_{SCM, abs} + (-196) * FW_{CM, abs}$$

Echter, zowel *CM* en *SCM* als de index *UGH* worden gepubliceerd als relatieve fokwaarde met een gemiddelde van 100 en een spreiding van 4. Daarom moeten de gewichten voor *SCM* en *CM* ook worden vertaald naar de relatieve schaal.

Gegeven de economische schade van een geval van *SCM* of *CM* (Tabel 5), de varianties van en covariantie tussen *CM* en *SCM* is de genetische spreiding van de index €11,82. De genetische spreiding (*sdG*) van de economische schade van *SCM* en *CM* zijn respectievelijk € 83,- * 0,0682 = € 5,66 en €196 * 0,0385 = € 7,55. Omdat de index op dezelfde relatieve schaal wordt uitgedrukt als *SCM* en *CM* zijn de relatieve gewichten van beiden eenvoudig te berekenen:

$$\begin{aligned} W_{rel,SCM} &= \text{sdG€}(SCM) / \text{sdG€}(Index) = € 5,66 / € 11,82 = 0,477 \\ W_{rel,CM} &= \text{sdG€}(CM) / \text{sdG€}(Index) = € 7,55 / € 11,82 = 0,641 \end{aligned}$$

De uiergezondheidsindex wordt dus berekend uit de relatieve fokwaarden *CM* en *SCM* volgens de formule:

$$FW_{UGH,rel} = 100 + 0,477 * [FW_{SCM,rel} - 100] + 0,641 * [FW_{CM,rel} - 100]$$

Deze relatieve fokwaarde of index heeft, net als de fokwaarden *CM* en *SCM* een gemiddelde van 100 en een spreiding van 4.

Tabel 5 Berekening van de gewichten voor *SCM* en *CM* voor een index uiergezondheid op relatieve schaal (gemiddelde 100, afwijking 4). *W_Econ* is de economische schade van een infectie. De variantie/covariantie matrix op de absolute schaal voor *CM* en *SCM* is gegeven onder (co-)var, evenals de voorspelde variantie van *UGH*; *sdG* is de genetische spreiding van *CM* en *SCM* op absolute schaal. De standaardafwijking van de economische schade, uitgedrukt in euro's staat gegeven onder *sdG€*. De daaruit volgende weging voor *SCM* en *CM* op de relatieve schaal staat gegeven onder *W_Rel*.

	(co-)var		<i>W_Econ</i>	<i>sdG</i>	<i>sdG€</i>	<i>W_Rel</i>
	<i>SCM</i>	<i>CM</i>				
<i>SCM</i>	0,00465	0,00155	€ 83,-	0,0682	€ 5,66	0,477
<i>CM</i>	0,00155	0,00148	€ 196,-	0,0385	€ 7,55	0,641
<i>UGH (SCM + CM)</i>	€139,60				€ 11,82	

W_Econ zijn als positieve bedragen weergegeven, omdat de fokwaarden omgeschaald worden: hoger fokwaarden wijzen op lagere incidenties. Bedragen moeten dan ook worden opgevat als besparingen.


▪ Betrouwbaarheid

Fokwaarden zijn schattingen van de genetische aanleg. Het woord ‘schatting’ geeft aan dat er een bepaalde onnauwkeurigheid rust op een fokwaarde. De betrouwbaarheid van een fokwaarde geeft aan hoeveel verschil er kan bestaan tussen de geschatte fokwaarde en de werkelijke genetische aanleg.

De betrouwbaarheid is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare informatie van een dier. Er zijn drie informatiebronnen:


1. eigen prestatie
2. nakomelingen
3. ouders

Informatie over de uiergezondheid van (half)zussen, grootouders, etc. wordt meegenomen via de ouders, en informatie van kleindochters etc. wordt meegenomen via de nakomelingen.



In Figuur 2 wordt een indruk gegeven van de betrouwbaarheden voor de fokwaarden *CM* en *SCM* en van de uiergezondheidsindex *UGH*. De betrouwbaarheid van stieren geboren tussen 2015 en 2018 is in Figuur 2 een stuk lager, omdat voor deze stieren minder dochters en minder lactaties bekend zijn. In het algemeen kan gezegd worden dat een stier met 100 dochters of meer gemiddeld een betrouwbaarheid scoort van 87% voor de index *UGH* en voor de fokwaarde subklinische mastitis en 83% voor fokwaarde klinische mastitis.

Figuur 2. Gemiddelde betrouwbaarheid van de fokwaarden voor de index *UGH*, *CM* en *SCM* van stieren, geboren tussen 2000 en 2018, met 100 of meer nakomelingen (gebaseerd op data t/m augustus 2022).



▪ Basis

Zie hoofdstuk ‘Bases voor fokwaarden en basisverschillen’.

▪ Publicatie

Presentatie

De fokwaarden voor de mastitiskenmerken (*CM*, *SCM* en *UGH*) worden gepresenteerd met een gemiddelde van 100 en een spreiding van 4. Hierbij is het belangrijk om te onthouden dat getallen boven de 100 wenselijk zijn. Een fokwaarde voor *CM* van meer dan 100 geeft aan dat klinische mastitis in de dochtergroep *minder* voor zal komen. Een fokwaarde groter dan 100 voor *UGH* zal het voorkomen van zowel klinische als subklinische mastitis verminderen.

De fokwaarden *CM* en *SCM* worden op absolute schaal uitgedrukt in incidenties (kans op infectie per koe per lactatie). Op de relatieve schaal, waarin de fokwaarden gepubliceerd worden, komt een afwijking van één spreiding (4 punten) overeen met een verandering van incidentie van 6,8% (voor *SCM*) en 4,0% (voor *CM*). De daarbij behorende kosten/besparingen komen overeen met respectievelijk € 5,68 en € 7,52 per nakomeling per lactatie. In de uiergezondheidsindex komt één spreiding overeen met € 11,82 per nakomeling per lactatie.

Een fokwaarde boven de 100 betekent dus een bovengemiddelde resistentie tegen mastitis. Een stier met een fokwaarde voor resistentie tegen subklinische mastitis van 104 geeft een groep dochters waarin subklinische mastitis $\frac{1}{2} * (104 - 100) * 1,7\% = 3,4\%$ minder voorkomt. Dat komt overeen met een besparing van € 2,84 per dochter per lactatie. Een fokwaarde van 104 voor de index *UGH* betekent dat per dochter gemiddeld zo'n $\frac{1}{2} * (104 - 100) * € 2,96 = € 5,91$ per lactatie bespaard kan worden aan kosten verbonden met subklinische en/of klinische mastitis.

De verwachte response van selectie op *UGH* in fokstieren is een afname per generatie van subklinische mastitis van 4%, een afname van klinische mastitis van 2,5% en een besparing van € 8,35 per koe per lactatie.

▪ Publicatie-eisen

Zie hoofdstuk 'Publicatieregels Stieren'.

Tabel 6 Overzicht van de erfelijkheidsgraden (diagonaal, vetgedrukt), genetische correlaties (boven de diagonaal) en restcorrelaties (onder de diagonaal) voor de 21 kenmerken in de fokwaardeschatting uiergezondheid.

lactatie	1ste lactatie							2de lactatie							3de lactatie							
	SCS150	SCS400	Inf	Ernst	Piek	SCM	CM	SCS150	SCS400	A_Inf	Ernst	Piek	SCM	CM	SCS150	SCS400	Inf	Ernst	Piek	SCM	CM	
1 ^{ste}	SCS150	0,088	0,889	0,879	0,928	0,825	0,836	0,745	0,861	0,705	0,652	0,736	0,813	0,558	0,645	0,827	0,684	0,554	0,734	0,728	0,440	0,638
	SCS400	0,538	0,105	0,926	0,936	0,770	0,916	0,713	0,857	0,875	0,834	0,881	0,766	0,768	0,590	0,779	0,861	0,810	0,859	0,708	0,691	0,495
	Inf	0,623	0,609	0,061	0,930	0,717	0,916	0,553	0,851	0,838	0,870	0,883	0,722	0,735	0,530	0,767	0,833	0,758	0,833	0,687	0,697	0,497
	Ernst	0,781	0,829	0,686	0,094	0,764	0,911	0,660	0,874	0,802	0,779	0,838	0,742	0,667	0,548	0,796	0,745	0,678	0,832	0,718	0,579	0,511
	Piek	0,571	0,509	0,392	0,487	0,050	0,769	0,790	0,853	0,705	0,581	0,655	0,888	0,688	0,874	0,869	0,677	0,573	0,760	0,836	0,406	0,786
	SCM	0,212	0,451	0,664	0,295	0,169	0,022	0,588	0,863	0,875	0,828	0,895	0,779	0,695	0,611	0,753	0,817	0,788	0,872	0,720	0,687	0,516
	CM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,659	0,511	0,454	0,493	0,768	0,542	0,676	0,720	0,556	0,504	0,658	0,664	0,356	0,671
2 ^{de}	SCS150	0,186	0,216	0,151	0,199	0,116	0,091	0,000	0,098	0,824	0,742	0,859	0,894	0,720	0,774	0,951	0,816	0,737	0,884	0,915	0,609	0,762
	SCS400	0,161	0,254	0,173	0,198	0,101	0,130	0,000	0,535	0,101	0,930	0,954	0,689	0,898	0,558	0,785	0,930	0,913	0,915	0,769	0,829	0,539
	Inf	0,126	0,176	0,130	0,153	0,082	0,087	0,000	0,546	0,615	0,060	0,941	0,583	0,864	0,435	0,695	0,903	0,893	0,905	0,646	0,812	0,472
	Ernst	0,183	0,268	0,189	0,261	0,141	0,122	0,000	0,792	0,824	0,667	0,094	0,686	0,816	0,575	0,796	0,906	0,899	0,935	0,756	0,798	0,572
	Piek	0,119	0,132	0,107	0,141	0,107	0,062	0,000	0,583	0,556	0,365	0,511	0,055	0,601	0,873	0,915	0,755	0,635	0,769	0,886	0,513	0,791
	SCM	0,070	0,123	0,093	0,112	0,050	0,069	0,000	0,276	0,512	0,471	0,427	0,358	0,026	0,554	0,736	0,895	0,866	0,865	0,731	0,816	0,501
	CM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024	0,833	0,638	0,481	0,693	0,830	0,375	0,806
3 ^{de}	SCS150	0,177	0,189	0,123	0,147	0,080	0,080	0,000	0,232	0,273	0,167	0,244	0,163	0,126	0,000	0,087	0,803	0,682	0,856	0,962	0,580	0,862
	SCS400	0,127	0,196	0,144	0,151	0,065	0,108	0,000	0,240	0,374	0,258	0,312	0,185	0,203	0,000	0,536	0,111	0,908	0,915	0,772	0,869	0,530
	Inf	0,099	0,128	0,080	0,091	0,043	0,055	0,000	0,152	0,239	0,187	0,199	0,115	0,137	0,000	0,527	0,589	0,066	0,884	0,663	0,862	0,444
	Ernst	0,161	0,202	0,141	0,174	0,088	0,096	0,000	0,257	0,335	0,224	0,337	0,195	0,174	0,000	0,801	0,828	0,650	0,096	0,822	0,769	0,647
	Piek	0,092	0,115	0,079	0,112	0,052	0,053	0,000	0,154	0,192	0,112	0,177	0,153	0,116	0,000	0,594	0,555	0,337	0,499	0,054	0,631	0,837
	SCM	0,087	0,104	0,089	0,085	0,032	0,073	0,000	0,087	0,188	0,151	0,149	0,077	0,131	0,000	0,223	0,454	0,451	0,362	0,307	0,041	0,257
	CM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,032

▪ Literatuur

Haas, Y. de. G. de Jong, J. ten Napel, W. Ouweltjes, O. Sampimon, R. Veerkamp and J. Windig (2007) Beest 5 - Verbetering van weerstand tegen mastitis via fokkerij – Eindrapport, UGCN, Deventer.

Haas, Y. de, W. Ouweltjes, J. ten Napel, J. Windig and G. de Jong (2008) Alternative traits for somatic cell counts as mastitis-indicators for genetic selection, J. Dairy Sci. 91:2501-2511.

Halasa T., M. Nielen, A. P. W. De Roos, R. Van Hoorne, G. de Jong, T. J. G. M. Lam, T. van Werven, and H. Hogeveen (2009) Production Loss Due to New Subclinical Mastitis in Dutch Dairy Cows Estimated With a Test-Day Model, J. Dairy Sci.92:599-606

Huijps, K., T.J.G.M. Lam and H. Hogeveen (2008) Costs of mastitis : facts and perception, J. Dairy Sci. 75: 113–120.

Ten Napel J., Y. de Haas, G. de Jong, T. Lam, J. Windig, W. Ouweltjes (2009) Characterization of distributions of somatic cell counts, J. Dairy Sci. 92:1253-1264

Ouweltjes W., J.J. Windig, G. de Jong, T.J.G.M. Lam, J. ten Napel, and Y. de Haas (2008) The Use of Data from Sampling for Bacteriology for Genetic Selection against Clinical Mastitis, J. Dairy Sci. 91:4860-4870